

Séparation cutanéomuqueuse

Éducation du patient

Coloplast®
Professional

Une séparation cutanéomuqueuse est le détachement au point de jonction de la suture entre la stomie et la peau. Elle peut être observée chez le sujet dont la guérison est compromise. Cette complication surviendra surtout au cours des trente premiers jours suivant l'opération.



Suggestions de fournitures

- Guide de mesure
 - Protecteur cutané Coloplast®
 - Sac Coloplast®
 - Les produits absorbants suivants peuvent être nécessaires :
 - Poudre pour stomie Brava®
 - Alginate Biatain®
 - Barrière cutanée Brava® (protection cutanée en aérosol)*
*Appliquer selon les recommandations de la stomathérapeute sur une peau intacte seulement
 - Pellicule protectrice Brava®
 - Papier hygiénique
 - Linge doux ou essuie-main doux
 - Eau tiède
 - Sac en plastique
- | |
|--------------------|
| N° de commande : _ |
| N° de commande : _ |
| N° de commande : _ |
| N° de commande : _ |
| N° de commande : _ |
| N° de commande : _ |
| N° de commande : _ |

Facteurs de risque de séparation cutanéomuqueuse

- | | | |
|-------------|-------------------------|-----------------|
| • Stéroïdes | • Nécrose de la stomie | • Sepsie |
| • Diabète | • Malnutrition | • Vasopresseurs |
| • Infection | • Distension abdominale | |

Traitement

1. Nettoyez la peau avec une eau tiède et un essuie-main en papier doux ou un linge doux.
2. Nettoyez la zone séparée (ouverte) à l'aide d'une solution saline, comme recommandé par votre stomathérapeute.
3. Rincez soigneusement et séchez en tapotant.
4. Pour un drainage complet, remplissez la partie séparée d'un matériau absorbant, comme recommandé par votre stomathérapeute ou votre médecin :
 - Poudre pour stomie Brava®
 - Alginate de calcium (Alginate Biatain®)
5. Si recommandé par votre stomathérapeute, appliquez la barrière cutanée Brava® en aérosol ou les lingettes sur la peau intacte autour de la stomie et laissez sécher. Ne pas appliquer sur les zones ouvertes.
6. Installez le système de sac. (**Réchauffez le protecteur cutané** entre vos mains avant l'installation. Appliquez une légère pression pour assurer une bonne adhérence du joint autour de la stomie).

Afin d'assurer que la séparation cicatrise bien, il est possible que votre stomathérapeute vous recommande de changer votre appareillage plus souvent que la normale et de remplacer le matériau absorbant. Communiquez avec votre médecin ou stomathérapeute si, après deux semaines, vous ne constatez pas d'amélioration.

Renseignements additionnels

ISPSC : _____

Médecin : _____

Fournisseur de produits pour stomie : _____

Numéro de téléphone : _____

Adresse : _____

Directives particulières

Les recommandations et renseignements fournis dans la présente documentation ne doivent pas remplacer un avis médical ou un diagnostic personnel.